



kwaliteitskeurmerk voor onze Kinderafdeling,  
in december 2008 door het Ruwaard van Putten  
Ziekenhuis ontvangen.

## LHRH-TEST

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de LHRH-test. Leest u deze informatie zorgvuldig. Indien voor u en/of uw kind van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts of de kinderverpleegkundige aan u en/of uw kind worden meegedeeld.



### Doel van het onderzoek

Uw behandelend arts onderzoekt door middel van de LHRH-test hoe de afgifte van de hormonen LH en FSH door de hypofyse (= een klier in de hersenen) functioneert. De stof Lucrin stimuleert de hypofyse tot afscheiding van de hormonen LH en FSH. Deze hormonen stimuleren de geslachtsklieren tot het maken van geslachtshormonen. Een gestoorde functie van de hypofyse kan stoornissen geven in de puberteitsontwikkeling.

Deze test wordt gedaan om te onderzoeken of uw kind te vroeg in de puberteit komt.

### De voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats in dagbehandeling. De afspraak voor de dagopname wordt met u en uw kind gemaakt op de polikliniek. U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn.

Uw kind heeft geen specifieke voorbereiding nodig voor het onderzoek. Hij/zij mag vooraf en tijdens de test gewoon eten en drinken.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis  
Ruwaard van Puttenweg 500  
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88  
E [info@rpz.nl](mailto:info@rpz.nl)  
I [www.rpz.nl](http://www.rpz.nl)



Bij uw kind wordt een naaldje in de arm ingebracht waardoor de LHRH wordt toegediend en bloed wordt afgenomen. Als uw kind angstig is voor de prik kunt u om een Emla-pleister vragen. Deze pleister wordt een uur van tevoren op de prikplaats geplakt zodat de huid verdoofd is tijdens het prikken.

Wij adviseren u iets mee te nemen waarmee uw kind zich kan vermaken.

### **Dag van het onderzoek**

Op de afgesproken dag en tijd melden u en uw kind zich op de Kinderafdeling waar u door een kinderverpleegkundige wordt ontvangen en de voorbereidingen voor het onderzoek plaatsvinden.

Door toediening van de medicijnen kan uw kind een beetje duizelig en warm worden. Daarom moet uw kind tijdens het gehele onderzoek op een bed blijven liggen.

De behandelend arts brengt het naaldje in de arm in waardoor de LHRH wordt toegediend. Voor en na toediening van de LHRH wordt door het naaldje bloed afgenomen.

Na het onderzoek wordt het naaldje verwijderd en kunnen u en uw kind naar huis. De totale opname duurt ongeveer 1,5 uur.

### **Wat kunt u uw kind vertellen**

Vertel uw kind

- dat hij/zij 1,5 uur in het ziekenhuis moet zijn voor het onderzoek, maar dat u erbij mag blijven.
- dat hij/zij gewoon mag eten en drinken.
- dat hij/zij een naaldje in de arm krijgt voor toediening van de LHRH en bloedafname en dat dit misschien even pijn doet.
- dat hij/zij verder niet meer geprikt hoeft te worden.
- dat hij/zij tijdens het onderzoek in bed moet liggen, omdat hij/zij duizelig en warm kan worden van de medicijnen.
- dat het naaldje na het onderzoek wordt verwijderd en dat dit geen pijn doet.
- dat hij/zij na het onderzoek uit bed mag en weer naar huis.

### **Nazorg**

Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig.

### **Uitslag**

De uitslag van het onderzoek wordt door uw behandelend arts met u en uw kind besproken tijdens uw vervolgspraak op de polikliniek.



### **Tot slot**

Voor meer informatie over de rechten van Kind en Ouder in ziekenhuizen in het algemeen en in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in het bijzonder, verwijzen wij u naar de folder Kind in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Deze kunt u o.a. vinden op onze website [www.rpz.nl](http://www.rpz.nl). Daar treft u tevens onder het kopje Patiënten/Kind en Ziekenhuis de button **JA Dokter NEE Dokter** met zeer nuttige informatie over dit onderwerp.

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de kinderverpleegkundige.

De medewerkers van de Kinderafdeling zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 82 10.

