

ECHOGELEIDE LEVERBIOPSIE

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u algemene informatie over een echogeleide leverbiopsie in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

Wat is een echogeleide leverbiopsie

Een echogeleide leverbiopsie is een onderzoek waarbij de radioloog met een naald een stukje weefsel uit de lever haalt, dat daarna in het laboratorium wordt onderzocht.

Doel van het onderzoek

Door middel van weefselonderzoek van de lever krijgt uw behandelend arts meer duidelijkheid over de voorlopig gestelde indicatie en kan naar verwachting een diagnose worden gesteld.

Vorbereiding op het onderzoek

Om een leverbiopsie goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u nuchter bent op de dag van het onderzoek. Dat wil zeggen dat u tot zes uur voor het onderzoek een licht verteerbare maaltijd mag gebruiken (= kopje thee met een beschuitje of cracker).

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88
E info@rpz.nl
I www.rpz.nl



Tijdens uw bezoek op de polikliniek informeert uw behandelend arts naar eventuele bijzonderheden en vraagt welke medicijnen u gebruikt.

Vertel uw behandelend arts in ieder geval vóór het onderzoek

- of u zwanger bent.
- of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of materialen.
- welke medicijnen u gebruikt (bijvoorbeeld bloedverdunners of insuline).
- of u een longziekte, epilepsie of andere aandoening heeft.
- of u een hartafwijking en/of hartgebrek heeft.

Voor het onderzoek is het noodzakelijk het gebruik van bepaalde medicijnen tijdelijk te stoppen (o.a. bloedverdunners en een aantal soorten pijnstillers). Uw behandelend arts zal dit met u bespreken en u adviseren.

Wij verzoeken u uw patiëntenkaart mee te nemen op de dag van het onderzoek en een lijstje met alle medicijnen die u gebruikt. Wij verzoeken u deze mee te nemen in de originele verpakking!

Wij adviseren u niet knellende en makkelijk zittende kleding te dragen en geen sieraden te dragen en/of waardevolle spullen mee te

nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen.

In de meeste gevallen kunt u een paar uur na het onderzoek naar huis. Soms is het echter nodig een nacht ter observatie te blijven. Wij verzoeken u dan ook een tas met nachtkleding en toiletspullen mee te nemen.

De dag van het onderzoek

Nadat u zich bij de afdeling Opname (route 58) heeft gemeld, wordt u door één van de medewerkers/vrijwilligers naar de verpleegafdeling gebracht.

Op de verpleegafdeling heeft u vervolgens een opnamegesprek met een verpleegkundige, die uw gegevens met u doorneemt. Tevens kan het zijn dat nog bloedonderzoek wordt verricht.

Het onderzoek zelf vindt plaats op de afdeling Radiologie. U wordt hier met uw bed naar toe gereden.

Het onderzoek

De lever bevindt zich rechts in de bovenbuik. Door middel van echografie bepaalt de radioloog de plaats waar geprikt zal worden. De huid wordt gedesinfecteerd en u krijgt



een plaatselijke verdovingsprik. Als de verdoving is ingewerkt volgt de eigenlijke biopsie.

De radioloog prikt met een dunne holle naald in de lever. In de holte van de naald wordt een stukje leverweefsel mee omhoog gehaald. Meestal wordt 2 à 3 keer geprikt. Daarna wordt de insteekplaats met een pleister afgedekt. Het weefsel gaat naar het laboratorium voor onderzoek. De uitslag is meestal na 2 weken bekend.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u 2 uur niet eten en drinken.

Om de kans op een nabloeding te verminderen, heeft u 2 uur bedrust. Hierbij ligt u gedraaid op uw rechterzij, waardoor het wondje wat wordt dichtgedrukt. Een verpleegkundige controleert regelmatig de pleister en houdt ook uw bloeddruk en hartslag in de gaten.

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u een pijnlijk gevoel ervaren bij de insteekplaats. Soms treedt een wat uitstralende pijn op in de rechter schouder. Dit is een normaal verschijnsel en wordt veroorzaakt door

prikkeling van het leverkapsel. U kunt de verpleegkundige eventueel om een pijnstiller vragen. Als u thuis bent kunt u nog 1 of 2 dagen last hebben. Bij pijnklachten kunt u paracetamol, bij voorkeur zonder coffeine, gebruiken. Zie voor de juiste dosering de bijsluiter in de verpakking.

De pleister kunt u de dag na het onderzoek zelf verwijderen.

U dient tot 48 uur na de ingreep zware lichamelijke arbeid te vermijden.

Complicaties

Een echogeleide leverbiopsie is over het algemeen een veilig onderzoek. Zoals bij elk onderzoek kunnen echter complicaties optreden.

In zeldzame gevallen kan na het onderzoek een bloeding ontstaan. U zult dan in het ziekenhuis moeten blijven voor behandeling van deze complicatie.

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken bij uw volgende bezoek. De verpleegkundige zal een afspraak voor u maken en deze noteren op uw afsprakenkaart.



Verhinderung

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de medewerkers van de polikliniek Inwendige Geneeskunde. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 83 50. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

