

## GASTROSCOPIE

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u algemene informatie over een gastroscopie (= maagonderzoek) in ons ziekenhuis. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

### Uw afspraak

Datum en tijd \_\_\_\_\_

U dient zich te melden bij route 109 (= 1e verdieping).

### Wat is een gastroscopie

Met een gastroscopie wordt de binnenkant van de maag onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een gastroscop. Dit is een dunne flexibele slang voorzien van een lampje en kleine camera. Op deze manier kan uw behandelend arts de binnenkant van uw maag onderzoeken.

### Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kan uw behandelend arts afwijkingen aan uw slokdarm, maag of twaalfvingerige darm opsporen. Ook kunnen via de gastroscop kleine ingrepen worden gedaan zoals het verwijderen van kleine poliepen of het opheffen van verklevingen.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis  
Ruwaard van Puttenweg 500  
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88  
E [info@rpz.nl](mailto:info@rpz.nl)  
I [www.rpz.nl](http://www.rpz.nl)



Verder kan op deze manier weefsel worden weggenomen voor nader onderzoek (= biopsie).

### **Vorbereiding op het onderzoek**

Een gastroscopie wordt in dagbehandeling uitgevoerd. **Als u 's ochtends wordt geholpen, mag u de avond vóór het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken.** Ook het kauwen van kauwgom is niet toegestaan. Als het onderzoek in de middag plaatsvindt mag u 's ochtends tussen 07.00 en 07.30 uur nog een licht ontbijt (= kopje thee en een beschuitje) gebruiken.

Vertel uw behandelend arts in ieder geval vóór het onderzoek

- of u zwanger bent.
- of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.
- welke medicijnen u gebruikt (bijvoorbeeld bloedverduunners of insuline).
- of u een longziekte, epilepsie of andere aandoening heeft.
- of u een hartafwijking en/of hartgebrek heeft.

Meestal is het nodig te wachten met het innemen van uw medicijnen tot na het onderzoek. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken. Neemt u uw medicijnen in

ieder geval mee naar het ziekenhuis zodat u deze na het onderzoek kunt innemen.

Het onderzoek vindt plaats op de Behandel- polikliniek. Wij verzoeken u uw patiënten- kaart mee te nemen op de dag van het onderzoek en een lijstje met alle medicijnen die u gebruikt. Wij adviseren u niet knellen- de en makkelijk zittende kleding te dragen en geen sieraden te dragen en/of waarde- volle spullen mee te nemen naar het zieken- huis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen. Tevens verzoeken wij u, indien van toepassing, tongpiercings te verwijderen.

### **Het onderzoek**

Na binnenkomst wordt u verzocht op uw linkerzij op de onderzoektafel te gaan liggen. Als voorbereiding op het onderzoek wordt uw keel verdoofd met een spray om de neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarna krijgt u een plastic bijtring tussen de tanden of kaken ge- plaatst. Uw behandelend arts brengt via uw mond de dunne flexibele slang in uw maag. Hiervoor vraagt hij u te slikken. Tijdens deze handeling blijft u rustig door uw neus en mond ademhalen. Het licht in de behan- delkamer wordt tijdens het onderzoek gedimd. Doordat via de slang lucht in de



maag wordt geblazen, kan het zijn dat u tijdens het onderzoek moet opboeren. Dit is een normaal verschijnsel en u hoeft zich hier niet voor te schamen.

Het onderzoek verloopt het beste als u probeert zo ontspannen mogelijk te zijn. Het inbrengen van de slang is een vervelend gevoel maar doet geen pijn omdat uw keel is verdoofd. U hoeft niet bang te zijn dat u geen lucht meer krijgt want er blijft naast de slang nog genoeg ruimte in de keelholte over om te ademen.

Het onderzoek duurt ± 15 minuten, afhankelijk van eventuele extra ingrepen.

### **Na het onderzoek**

Het kan zijn dat uw keel een beetje rauw en gevoelig aanvoelt, vooral als u veel heeft moeten opboeren. Dit gaat snel weer over.

U mag tenminste een half uur na het onderzoek niet eten en drinken. Uw keel is verdoofd en u zou zich gemakkelijk kunnen verslikken. Begint u daarna voorzichtig kleine beetjes te drinken en te eten.

### **Mogelijke complicaties**

Een gastroscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Zoals bij elk onderzoek kunnen echter complicaties optreden zoals

- een luchtweginfectie of longontsteking als gevolg van het zich verslikken in de maaginhoud. Dit gebeurt vaker bij mensen die een roesje hebben gehad. Om die reden wordt een roesje meestal niet gegeven.
- een scheurtje in de slokdarm of maag. Dit komt echter zelden voor.
- problemen bij spoedingrepen als iemand niet nuchter is (bijvoorbeeld bij een maagbloeding).

Hoe meer ingrepen tijdens het onderzoek worden gedaan, hoe groter de kans op complicaties.

De behandelend arts die het onderzoek voorstelt, weegt altijd de kleine kans op dergelijke complicaties af tegen de voordelen van de belangrijke informatie die door de gastroscopie wordt verkregen.

Indien na het onderzoek klachten optreden, bijvoorbeeld koorts of benauwdheid, neemt u dan contact op met uw behandelend arts via de medewerkers van de Behandelpolikliniek. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar. Buiten kantooruren en in het weekend adviseren wij u contact op te nemen met de huisarts.



### **De uitslag**

Uw behandelend arts en/of uw huisarts zal de definitieve uitslag van het onderzoek met u bespreken als u voor controle komt.

### **Tot slot**

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige. De medewerkers van de Behandelpolikliniek, route 109 (= 1e verdieping), zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 83 35.

Meer informatie kunt u vinden op

[www.mlds.nl](http://www.mlds.nl)

[www.crohn-colitis.nl](http://www.crohn-colitis.nl)

[www.voedingscentrum.nl](http://www.voedingscentrum.nl)

