

BEHANDELING VAN SPATADEREN VOLGENS MULLER

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de behandeling van spataderen volgens Muller (= ambulante flebectomie). Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

Algemeen

Niet elke spatader wordt op deze wijze behandeld. Hele kleine vaatjes worden weggespoten (sclerotherapie of laserbehandeling). Grote vaten worden poliklinisch met een endovasculaire therapie (VNUS Closure Procedure) behandeld of operatief onder narcose weggehaald. Middelgrote vaten komen in aanmerking voor de behandeling volgens Muller, het zogenaamde Mulleren. Wanneer een spatader vroeger is behandeld door middel van wegsputten dan is deze minder goed te behandelen met Mulleren.

Vorbereiding

Mulleren is een poliklinische behandeling. U hoeft niet nuchter te zijn en u hoeft niet te worden opgenomen. U kunt na de behandeling en een half uur bedrust meteen weer naar huis.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse

T 0181 65 88 88
E info@rpz.nl
I www.rpz.nl



Als u naar het ziekenhuis komt voor deze behandeling, dient u elastische kousen mee te nemen. U krijgt van uw behandelend arts een recept waarmee u bij de bandagist (o.a. de heer Oldekamp, Marrewijklaan 14 te Spijkenisse) elastische kousen kunt laten aanmeten. Wij adviseren u de kousen tijdig te laten aanmeten omdat het soms twee weken kan duren voordat de kousen gereed zijn.

De behandeling vindt plaats op de Behandelpolikliniek, route 99.

De behandeling

Uw behandelend arts start de behandeling met het aftekenen van de te behandelen spatader. U staat hierbij rechtop. Voor het vervolg van de behandeling vraagt zij/hij u op de behandeltafel te gaan liggen. De huid rondom het te behandelen bloedvat wordt gedesinfecteerd en door middel van een aantal prikjes verdoofd. Het inspuiten geeft een branderig gevoel. Daarna mag u van de rest van de behandeling niets meer voelen. Voelt u toch pijn dan dient u dat direct te melden.

Uw behandelend arts prikt met een klein puntig mesje een gaatje in de huid naast de spatader. Vervolgens brengt zij/hij door dit gaatje een soort haaknaaldje onder de huid.

Onder de huid wordt het te behandelen vaatje aangehaakt en naar buiten getrokken. Het vaatje wordt dan afgebonden of breekt spontaan. Deze procedure wordt enkele malen herhaald, afhankelijk van de lengte van het bloedvat.

Na de behandeling

Na de behandeling worden de kleine wondjes (prikgaatjes) afgedekt. De plaats waar de spatader heeft gezeten wordt voorzien van een flinke pluk watten. Hier overheen wordt de elastische kous aangetrokken. Vervolgens dient u 30 minuten op bed te blijven liggen in verband met mogelijke nabloedingen. Hierna gaat u naar huis en **dient u 2 uur in beweging te blijven**. Lopen is goed, staan is slecht. Wanneer u gaat zitten doet u dat bij voorkeur met de benen hoog.

De kousen en watten dienen 3 dagen en nachten te blijven zitten. U kunt dus 3 dagen niet douchen. Na 3 dagen mag u zelf de watten verwijderen. U dient nog wel minstens 2 weken de elastische kous(en) overdag te dragen! Soms wordt in plaats van de elastische kous(en) een Gelostretchverband aangelegd. Dit witte verband lijkt op gips maar is veel soepeler. Dit verband blijft 7 dagen zitten en wordt op de polikliniek verwijderd.



Wanneer de kous(en) of verbanden worden afgedaan ziet u eerst nog de nodige blauwe plekken. Dit is normaal. De plekken verdwijnen in de loop van enkele maanden.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatiefolder nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de assistente. Het telefoonnummer vindt u op uw afsprakenkaart.

