

SLOKDARM ECHOCARDIOGRAM

In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over een slokdarm echocardiogram (= transesofageale echocardiografie (TEE)). Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt met behulp van geluidsgolven informatie verkregen over de structuur en het functioneren van het hart en de hartkleppen. Een slokdarmecho wordt uitgevoerd wanneer een echo van de borst onvoldoende informatie geeft voor een goede diagnose. Bij dit onderzoek wordt naar het hart gekeken via een soepele slang met zender, die daartoe in de slokdarm wordt gebracht.

Vorbereiding op het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in dagbehandeling. U wordt hiertoe opgenomen op de afdeling Cardiologie.

U dient voor het onderzoek nuchter te zijn. U mag 3 uur vóór het onderzoek niets meer eten of drinken. Ook het kauwen van kauwgom is niet toegestaan. Wel mag u uw medicijnen met een klein slokje water innemen.



Op de afdeling wordt een infuusnaald ingebracht.

U mag na het onderzoek niet alleen naar huis gaan en ook niet zelf een voertuig te besturen. U dient vooraf begeleiding en vervoer naar huis te regelen.

Het onderzoek

U wordt op een bed naar de afdeling Cardiofunctie gebracht waar het onderzoek plaatsvindt. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij.

U wordt verzocht uw kunstgebit, indien van toepassing, uit te doen.

Vóór het inbrengen van de slang wordt uw keel verdoofd met een spray om de neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk tegen te gaan. Tevens wordt een mondstukje tussen uw tanden of kaken geplaatst ter bescherming van uw gebit en de slang.

Indien u wenst kunt u via het infuusnaaldje, dat ter voorbereiding reeds op de afdeling Cardiologie is ingebracht, een slaapmiddel toegediend krijgen. Het voordeel hiervan is, dat u niets van het onderzoek merkt. Het nadeel is dat u wat langer in het ziekenhuis dient te blijven omdat u enige tijd na het onderzoek nog slaperig kunt zijn.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

U mag tenminste een kwartier na het onderzoek niet eten en drinken. Uw keel is verdoofd en u zou zich gemakkelijk kunnen verslikken. Begint u daarna voorzichtig kleine beetjes te drinken en te eten.

Bijwerkingen

Na het onderzoek kan uw keel gevoelig zijn en indien u een slaapmiddel toegediend heeft gekregen kunt u enige tijd nog slaperig zijn.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek ontvangt u van uw behandelend arts bij uw volgende bezoek. Indien u bent opgenomen in het ziekenhuis, ontvangt u de uitslag van uw behandelend arts of de zaalarts tijdens de dagelijkse visiteronde.

Verhinderig

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent en uw afspraak niet kunt nakomen, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de medewerkers van de polikliniek Cardiofunctie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.



Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts, de verpleegkundige of de medewerkers van de polikliniek Cardiofunctie. Zij zijn op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0181) 65 84 28.

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen kunt u met uw vragen terecht bij een verpleegkundige van de afdeling waar u verblijft.

